

## 医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領2008に準拠して作成

鎮痛剤

**サリチル酸Na 静注 0.5g 「化1」**

SODIUM SALICYLATE I.V. 0.5g

剤 形	注射剤（水性注射液）
製 剤 の 規 制 区 分	処方箋医薬品 (注意—医師等の処方箋により使用すること)
規 格 ・ 含 量	1管(10mL) 中 サリチル酸ナトリウム 500mg含有
一 般 名	和名：サリチル酸ナトリウム 洋名：Sodium Salicylate
製 造 販 売 承 認 年 月 日 薬価基準収載・発売年月日	製造販売承認年月日 : 2018年 7月 13日 薬価基準収載年月日 : 2018年 12月 14日 発 売 年 月 日 : 2018年 12月 14日
開 発 ・ 製 造 販 売 (輸 入) ・ 提 携 ・ 販 売 会 社 名	製造販売元：コーライセイ株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問 い 合 わ せ 窓 口	コーライセイ株式会社 学術部 TEL: 023-622-7755 FAX: 023-624-4717 医療関係者向けホームページ <a href="http://www.isei-pharm.co.jp/">http://www.isei-pharm.co.jp/</a>

本IFは2018年12月作成の添付文書の記載に基づき作成した。  
 最新の添付文書情報は、医薬品医療機器情報提供ホームページ  
<http://www.pmda.go.jp/>にてご確認ください。

## I F 利用の手引きの概要－日本病院薬剤師会－

### 1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約として医療用医薬品添付文書(以下、添付文書と略す)がある。医療現場で医師、薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付け更に詳細な情報が必要な場合がある。

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生した。

昭和63年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第2小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、I Fと略す）の位置付け並びにI F記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの変化を受けて、平成10年9月に日病薬学術第3小委員会においてI F記載要領の改訂が行われた。

更に10年が経過した現在、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬事・医療環境は大きく変化したことを受け、平成20年9月に日病薬医薬情報委員会において新たなI F記載要領が策定された。

### 2. I Fとは

I Fは「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等はI Fの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたI Fは、薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

#### [ I F の様式 ]

- ①規格はA4版、横書きとし、原則として9ポイント以上の字体（図表は除く）記載し、一色刷りとする。ただし、添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。
- ②I F記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。
- ③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「I F利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2頁にまとめる。

#### [ I F の作成 ]

- ①I Fは原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。
- ②I Fに記載する項目及び配列は日病薬が策定したI F記載要領に準拠する。
- ③添付文書の内容を補完するとのI Fの主旨に沿って必要な情報が記載される。
- ④製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評価・判断・提供すべき事項については記載されない。
- ⑤「I F記載要領2008」により作成されたI Fは、電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（PDF）から印刷して使用する。企業での製本は必須ではない。

## [ I F の発行]

- ①「医薬品インタビューフォーム記載要領2008（以下、「I F 記載要領2008」と略す）は、平成21年4月以降に承認された新医薬品から適用となる。」
- ②上記以外の医薬品については、「I F 記載要領2008」による作成・提供は強制されるものではない。
- ③使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなされ、記載すべき内容が大きく変わった場合にはI F が改訂される。

## 3. I F の利用にあたって

「医薬品インタビューフォーム記載要領2008」においては、従来の主にMRによる紙媒体での提供に替え、PDFファイルによる電子媒体での提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則で、医療機関でのIT環境によっては必要に応じてMRに印刷物での提供を依頼してもよいこととした。

電子媒体のI Fについては、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、I Fの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やI F作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより薬剤師等自らが内容を充実させ、I Fの利用性を高める必要がある。

また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、I Fが改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、I Fの使用にあたっては、最新の添付文書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等は承認事項に関わることがあり、その取扱いには十分留意すべきである。

## 4. 利用に際しての留意点

I Fを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと限界がある。

I Fは日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならぬ。

また製薬企業は、I Fがあくまでも添付文書を補完する情報資料であり、今後のインタビューフォームでの公開等を踏まえて、薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報活用する必要がある。

（2008年9月）

# 目 次

I. 概要に関する項目	
1. 開発の経緯	1
2. 製品の治療学的・製剤学的特性	1
II. 名称に関する項目	
1. 販売名	2
2. 一般名	2
3. 構造式又は示性式	2
4. 分子式及び分子量	2
5. 化学名(命名法)	2
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	2
7. C A S 登録番号	2
III. 有効成分に関する項目	
1. 物理化学の性質	3
2. 有効成分の各種条件下における安定性	3
3. 有効成分の確認試験法	3
4. 有効成分の定量法	3
IV. 製剤に関する項目	
1. 剤形	4
2. 製剤の組成	4
3. 注射剤の調製法	4
4. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意	4
5. 製剤の各種条件下における安定性	4
6. 溶解後の安定性	5
7. 他剤との配合変化(物理化学的変化)	5
8. 生物学的試験法	5
9. 製剤中の有効成分の確認試験法	5
10. 製剤中の有効成分の定量法	5
11. 力価	5
12. 混入する可能性のある夾雑物	5
13. 治療上注意が必要な容器に関する情報	5
14. その他	5
V. 治療に関する項目	
1. 効能又は効果	6
2. 用法及び用量	6
3. 臨床成績	6
VI. 薬効薬理に関する項目	
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	7
2. 薬理作用	7
VII. 薬物動態に関する項目	
1. 血中濃度の推移・測定法	8
2. 薬物速度論的パラメータ	8
3. 吸収	8
4. 分布	9
5. 代謝	9
6. 排泄	9
7. 透析等による除去率	9

<b>VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目</b>	
1. 警告内容とその理由 .....	10
2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む） .....	10
3. 効能又は効果に関する使用上の注意とその理由 .....	10
4. 用法及び用量に関する使用上の注意とその理由 .....	10
5. 慎重投与内容とその理由 .....	10
6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法 .....	10
7. 相互作用 .....	11
8. 副作用 .....	11
9. 高齢者への投与 .....	12
10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与 .....	12
11. 小児等への投与 .....	12
12. 臨床検査結果に及ぼす影響 .....	12
13. 過量投与 .....	12
14. 適用上の注意 .....	12
15. その他の注意 .....	12
16. その他 .....	12
<b>IX. 非臨床試験に関する項目</b>	
1. 薬理試験 .....	13
2. 毒性試験 .....	13
<b>X. 管理的事項に関する項目</b>	
1. 規制区分 .....	14
2. 有効期間又は使用期限 .....	14
3. 貯法・保存条件 .....	14
4. 薬剤取扱い上の注意点 .....	14
5. 承認条件等 .....	14
6. 包装 .....	14
7. 容器の材質 .....	14
8. 同一成分・同効薬 .....	14
9. 国際誕生年月日 .....	14
10. 製造販売承認年月日及び承認番号 .....	14
11. 薬価基準収載年月日 .....	14
12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容 .....	15
13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容 .....	15
14. 再審査期間 .....	15
15. 投薬期間制限医薬品に関する情報 .....	15
16. 各種コード .....	15
17. 保険給付上の注意 .....	15
<b>X I. 文献</b>	
1. 引用文献 .....	16
2. その他の参考文献 .....	16
<b>X II. 参考資料</b>	
1. 主な外国での発売状況 .....	16
2. 海外における臨床支援情報 .....	16
<b>X III. 備考</b>	
その他の関連資料 .....	16

## I. 概要に関する項目

### 1. 開発の経緯

本剤はサリチル酸ナトリウムを主成分とする鎮痛剤であり、2018年7月13日に医療事故防止に伴う販売名変更品として製造販売承認を取得し、旧販売名の「ヘルパルス静注0.5g」の代替新規品として2018年12月14日付で薬価基準追補収載され発売を開始した。

### 2. 製品の治療学的・製剤学的特性

- (1) 本剤は1管(10mL)中にサリチル酸ナトリウム500mg含有する無色～微黄色澄明の水性注射液である。
- (2) 本剤はプロスタグランジン生合成を抑制することにより鎮痛作用を現し、症候性神経痛に使われる。

## II. 名称に関する項目

### 1. 販売名

#### (1) 和名

サリチル酸ナ 静注 0.5g 「化1」

#### (2) 洋名

SODIUM SALICYLATE I.V. 0.5g

#### (3) 名称の由来

一般名+剤形+含量+屋号

### 2. 一般名

#### (1) 和名(命名法)

サリチル酸ナトリウム(JAN)


#### (2) 洋名(命名法)

Sodium Salicylate(JAN)

#### (3) ステム

該当しない

### 3. 構造式又は示性式



### 4. 分子式及び分子量

分子式 : C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>NaO<sub>3</sub>

分子量 : 160.10

### 5. 化学名(命名法)

Monosodium 2-hydroxybenzoate

### 6. 慣用名、別名、略号、記号番号

特になし

### 7. C A S 登録番号

[54-21-7]

### III. 有効成分に関する項目

#### 1. 物理化学的性質

##### (1) 外観・性状

白色の結晶又は結晶性の粉末である。

##### (2) 溶解性

水に極めて溶けやすく、酢酸(100)に溶けやすく、エタノール(95)にやや溶けやすい。

##### (3) 吸湿性

該当資料なし

##### (4) 融点（分解点）、沸点、凝固点

該当資料なし

##### (5) 酸塩基解離定数

該当資料なし

##### (6) 分配係数

該当資料なし

##### (7) その他の主な示性値

乾燥減量：0.5%以下 (1g、105°C、2時間)

2.0g を水 20mL に溶かした液の pH は 6.0～8.0 である。

#### 2. 有効成分の各種条件下における安定性

光によって徐々に着色する。

#### 3. 有効成分の確認試験法（第十七改正日本薬局方解説書による）

##### (1) 赤外吸収スペクトル測定法

##### (2) ナトリウム塩の定性反応

#### 4. 有効成分の定量法（第十七改正日本薬局方解説書による）

電位差滴定法

## IV. 製剤に関する項目

### 1. 剤形

#### (1) 剤形の区別、規格及び性状

1) 剤形の区別

注射剤（水性注射液）

2) 規格

1管(10mL)中にサリチル酸ナトリウム500mgを含有する。

3) 性状

無色～微黄色澄明の水性注射液である。

#### (2) 溶液及び溶解時のpH、浸透圧比、粘度、比重、安定なpH域等

pH: 6.3～7.3

浸透圧比: 約2(生理食塩液に対する比)

#### (3) 注射剤の容器中の特殊な気体の有無及び種類

窒素

### 2. 製剤の組成

#### (1) 有効成分(活性成分)の含量

1管(10mL)中にサリチル酸ナトリウム500mgを含有する。

#### (2) 添加物

ピロ亜硫酸ナトリウム(安定剤) 2mg

水酸化ナトリウム(pH調整剤) 適量

#### (3) 電解質の濃度

該当しない

#### (4) 添付溶解液の組成及び容量

該当しない

#### (5) その他

該当しない

### 3. 注射剤の調製法

該当しない

### 4. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意

該当しない

### 5. 製剤の各種条件下における安定性

最終包装製品を用いた長期保存試験〔室温保存、3年〕の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、サリチル酸Na静注0.5g「他」は室温保存において3年間安定であることが確認されている。<sup>1)</sup>

## 6. 溶解後の安定性


該当しない

## 7. 他剤との配合変化（物理化学的変化）

サリチル酸Na 静注 0.5g 「化1」 の pH 変動スケール

pH : 6.95 [規格 6.3~7.3]

	添加量	pH	変動スケール
0.1mol/L HCl	4.1mL	3.82	3.13 (結晶析出)
0.1mol/L NaOH	10.0mL	12.53	5.58 (変化なし)



## 8. 生物学的試験法

該当しない

## 9. 製剤中の有効成分の確認試験法（製造販売承認書による）

- (1) 吸光度測定法
- (2) サリチル酸塩の定性反応(2)
- (3) サリチル酸塩の定性反応(1)
- (4) サリチル酸塩の定性反応(3)
- (5) ナトリウム塩の定性反応

## 10. 製剤中の有効成分の定量法（製造販売承認書による）

液体クロマトグラフ法

## 11. 力価

本剤は力価表示に該当しない。

## 12. 混入する可能性のある夾雜物

該当資料なし

## 13. 治療上注意が必要な容器に関する情報

該当しない

## 14. その他

特になし

## V. 治療に関する項目

### 1. 効能又は効果

症候性神経痛

### 2. 用法及び用量

サリチル酸ナトリウムとして、通常成人 1 回 0.5~1g を 1 日 1~数回静脈内注射する。  
なお、年齢、症状により適宜増減する。

### 3. 臨床成績

#### (1) 臨床データパッケージ（2009年4月以降承認品目）

該当しない

#### (2) 臨床効果

該当資料なし

#### (3) 臨床薬理試験：忍容性試験

該当資料なし

#### (4) 探索的試験：用量反応探索試験

該当資料なし

#### (5) 検証的試験

##### 1) 無作為化並行用量反応試験

該当資料なし

##### 2) 比較試験

該当資料なし

##### 3) 安全性試験

該当資料なし

##### 4) 患者・病態別試験

該当資料なし

#### (6) 治療的使用

##### 1) 使用成績調査・特定使用成績調査(特別調査)・

製造販売後臨床試験(市販後臨床試験)

該当資料なし

##### 2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要

該当しない

## **VII. 薬効薬理に関する項目**

### **1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群**

解熱鎮痛剤

### **2. 薬理作用**

#### **(1) 作用部位・作用機序**

アラキドン酸カスケードにおいて、シクロオキシゲナーゼを阻害することにより、アラキドン酸からプロstagランジン類 (PGs) の合成を抑制し、鎮痛作用、抗炎症作用を発揮すると考えられる。

#### **(2) 薬効を裏付ける試験成績**

該当資料なし

#### **(3) 作用発現時間・持続時間**

該当資料なし

## VII. 薬物動態に関する項目

### 1. 血中濃度の推移・測定法

#### (1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

#### (2) 最高血中濃度到達時間

該当資料なし

#### (3) 臨床試験で確認された血中濃度

該当資料なし

#### (4) 中毒域

該当資料なし

#### (5) 食事・併用薬の影響

「VIII. 7. 相互作用」の項参照

#### (6) 母集団(ポピュレーション)解析により判明した薬物体内動態変動要因

該当資料なし

### 2. 薬物速度論的パラメータ

#### (1) コンパートメントモデル

該当資料なし

#### (2) 吸収速度定数

該当資料なし

#### (3) バイオアベイラビリティ

該当資料なし

#### (4) 消失速度定数

該当資料なし

#### (5) クリアランス

該当資料なし

#### (6) 分布容積

該当資料なし

#### (7) 血漿蛋白結合率

該当資料なし

### 3. 吸収

該当資料なし

#### 4. 分布

##### (1) 血液－脳関門通過性

該当資料なし

##### (2) 血液－胎盤関門通過性

該当資料なし

##### (3) 乳汁への移行性

該当資料なし

##### (4) 髄液への移行性

該当資料なし

##### (5) その他の組織への移行性

該当資料なし

#### 5. 代謝

##### (1) 代謝部位及び代謝経路

該当資料なし

##### (2) 代謝に関与する酵素（CYP450等）の分子種

該当資料なし

##### (3) 初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

##### (4) 代謝物の活性の有無及び比率

該当資料なし

##### (5) 活性代謝物の速度論的パラメータ

該当資料なし

#### 6. 排泄

##### (1) 排泄部位及び経路

該当資料なし

##### (2) 排泄率

該当資料なし

##### (3) 排泄速度

該当資料なし

#### 7. 透析等による除去率

腹膜透析：該当資料なし

血液透析：該当資料なし

直接血液灌流：該当資料なし

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

### 1. 警告内容とその理由

該当しない

### 2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む）

#### 【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

1. 本剤又はサリチル酸系化合物（アスピリン等）に対し過敏症の既往歴のある患者
2. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照）

### 3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由

該当しない

### 4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由

該当しない

### 5. 慎重投与内容とその理由

- (1) 本人又は両親・兄弟に他の薬物に対するアレルギー、蕁麻疹、気管支喘息、アレルギー性鼻炎又は食物アレルギー等のある患者
- (2) 肝又は腎障害のある患者〔肝又は腎障害を悪化させるおそれがある。〕
- (3) 出血傾向のある患者〔血小板機能異常を起こすおそれがある。〕
- (4) 消化性潰瘍のある患者〔消化性潰瘍を悪化させるおそれがある。〕
- (5) 潰瘍性大腸炎の患者、クローン病の患者〔これらの症状を悪化させるおそれがある。〕

### 6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法

- (1) サリチル酸系製剤の使用実態は我が国と異なるものの、米国においてサリチル酸系製剤とライ症候群との関連性を示す疫学調査報告があるので、本剤を **15歳未満の水痘、インフルエンザの患者に投与しないことを原則とするが、やむを得ず投与する場合には、慎重に投与し、投与後の患者の状態を十分に観察すること。**〔ライ症候群：小児において極めてまれに水痘、インフルエンザ等のウイルス性疾患の先行後、激しい嘔吐、意識障害、痙攣（急性脳浮腫）と肝臓ほか諸臓器の脂肪沈着、ミトコンドリア変形、AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・CK(CPK)の急激な上昇、高アンモニア血症、低プロトロンビン血症、低血糖症等の症状が短期間に発現する高死亡率の病態である。〕
- (2) **ショック**を起こすことがあるので、経口投与が不可能な場合又は鎮痛が必要な場合にのみ投与を考慮すること。なお、本剤の使用に際しては、常時直ちに救急処置のとれる準備をしておくことが望ましい。
- (3) ショックなどの反応を予測するため、十分な問診を行うこと。
- (4) 高熱を伴う幼児・小児及び高齢者又は消耗性疾患の患者においては、作用が急激にあらわれ、**過度の体温下降、虚脱、四肢冷却等**があらわれることがある。これらの患者に投与する必要がある場合には、投与後の患者の状態に十分注意すること。
- (5) 投与後少なくとも10分間は患者を安静の状態に保たせ、観察を十分に行うこと。

## 7. 相互作用

### (1) 併用禁忌とその理由

該当しない

### (2) 併用注意とその理由

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
クマリン系抗凝血剤 ワルファリン 糖尿病用剤 インスリン製剤 トルブタミド等	これら薬剤の作用を増強するおそれがある。	本剤によりクマリン系抗凝血剤や糖尿病用剤が血漿蛋白から遊離することが考えられる。

## 8. 副作用

### (1) 副作用の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

### (2) 重大な副作用と初期症状

- 1) **ショック**（頻度不明）：ショックがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、胸内苦悶、血圧低下、顔面蒼白、脈拍異常、呼吸困難等があらわれた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2) **皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、剥脱性皮膚炎**（いずれも頻度不明）：皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、剥脱性皮膚炎があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 3) **再生不良性貧血**（頻度不明）：再生不良性貧血があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

### (3) その他の副作用

分類	頻度	不明
<b>過敏症</b> <sup>注1)</sup>	発疹、浮腫、鼻炎様症状、結膜炎等	
<b>血液</b> <sup>注1)</sup>	白血球減少、血小板減少、貧血等	
<b>精神神経系</b> <sup>注2)</sup>	耳鳴、難聴、めまい等	
<b>肝臓</b> <sup>注1)</sup>	黄疸、AST(GOT)・ALT(GPT)・Al-P の上昇等	
<b>腎臓</b> <sup>注1)</sup>	腎障害	
<b>消化器</b>	胃痛、食欲不振、恶心・嘔吐、消化管出血等	

注1) このような場合には投与を中止すること。

注2) このような場合には減量又は休薬等適切な処置を行うこと。

### (4) 項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

項目別副作用発現頻度：該当資料なし

臨床検査値異常一覧：該当資料なし

### (5) 基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度

該当資料なし

#### (6) 薬物アレルギーに対する注意及び試験法

- ・本剤又はサリチル酸系化合物（アスピリン等）に対し過敏症の既往歴のある患者には投与しないこと。
- ・本人又は両親・兄弟に他の薬物に対するアレルギー、蕁麻疹、気管支喘息、アレルギー性鼻炎又は食物アレルギー等のある患者には慎重に投与すること。
- ・ショックを起こすことがあるので、経口投与が不可能な場合又は緊急の鎮痛が必要な場合にのみ投与を考慮すること。なお、本剤の使用に際しては、常時直ちに救急処置のとれる準備をしておくことが望ましい。
- ・ショックなどの反応を予測するため、十分な問診を行うこと。
- ・ショックがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、胸内苦悶、血圧低下、顔面蒼白、脈拍異常、呼吸困難等があらわれた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- ・発疹、浮腫、鼻炎様症状、結膜炎等過敏症の症状があらわれた場合には投与を中止すること。

#### 9. 高齢者への投与

高齢者では、副作用があらわれやすいので、少量から投与を開始するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。（「重要な基本的注意」の項参照）

#### 10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。〔サリチル酸ナトリウムは動物実験で催奇形作用が報告されている。〕
- (2) 妊娠末期のラットに投与した実験で、弱い胎仔の動脈管収縮が報告されている。

#### 11. 小児等への投与

該当しない

#### 12. 臨床検査結果に及ぼす影響

該当資料なし

#### 13. 過量投与

該当資料なし

#### 14. 適用上の注意

##### (1) 投与速度

できるだけゆっくり投与すること。

##### (2) アンプルカット時

アンプルカット時のガラス片混入の少ないクリーンカットアンプルを使用しているが、さらに安全に使用するため、エタノール消毒綿等で清拭しカットすること。

#### 15. その他の注意

非ステロイド性消炎鎮痛剤を長期間投与されている女性において一時的な不妊が認められたとの報告がある。

#### 16. その他

該当しない

## IX. 非臨床試験に関する項目

### 1. 薬理試験

(1) 薬効薬理試験（「VI. 薬効薬理に関する項目」参照）

該当資料なし

(2) 副次的薬理試験

該当資料なし

(3) 安全性薬理試験

該当資料なし

(4) その他の薬理試験

該当資料なし

### 2. 毒性試験

(1) 単回投与毒性試験

該当資料なし

(2) 反復投与毒性試験

該当資料なし

(3) 生殖発生毒性試験

該当資料なし

(4) その他の特殊毒性

該当資料なし

## X. 管理的事項に関する項目

### 1. 規制区分

製剤：サリチル酸Na 静注 0.5g 「化」  
処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

有効成分：サリチル酸ナトリウム  
該当しない

### 2. 有効期間又は使用期限

使用期限：3年（安定性試験結果に基づく）

### 3. 貯法・保存条件

室温保存

### 4. 薬剤取扱い上の注意点

(1) 薬局での取り扱いについて  
該当しない

(2) 薬剤交付時の注意（患者等に留意すべき必須事項等）  
該当しない

### 5. 承認条件等

該当しない

### 6. 包装

10mL 50管

### 7. 容器の材質

無色ガラス（10mL アンプル）

### 8. 同一成分・同効薬

(1) 同一成分薬：  
サルソニン静注 0.5g（扶桑）等

(2) 同効薬：  
アスピリン、アセトアミノフェン、スルピリン水和物等

### 9. 国際誕生年月日

該当しない

### 10. 製造販売承認年月日及び承認番号

製造販売承認年月日：2018年7月13日  
承認番号：23000AMX00552000

### 11. 薬価基準収載年月日

2018年12月14日

**12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容**  
該当しない

**13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容**  
該当しない

**14. 再審査期間**  
該当しない

**15. 投薬期間制限医薬品に関する情報**  
本剤は投薬期間に関する制限は定められていない。

**16. 各種コード**

販 売 名	厚生労働省薬価 基準収載コード	レセプト 電算コード	H O T 番号
サリチル酸N a 静注 0.5g 「化1」	1143400A2157	620074601	100746601

**17. 保険給付上の注意**  
本剤は保険診療上の後発医薬品である。

## **X I. 文献**

### **1. 引用文献**

1) コーアイセイ株式会社：社内資料（安定性試験）

### **2. その他の参考文献**

該当資料なし

## **X II. 参考資料**

### **1. 主な外国での発売状況**

該当しない

### **2. 海外における臨床支援情報**

該当しない

## **X III. 備考**

### **その他の関連資料**

該当資料なし