

ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」

使用説明書


このおくすりは、
医師の指示に従い1日に1～数回
患部に噴霧してください。

- 初めて使用する際には、立てた状態で薬品が安定して噴霧されるまで4～6回空噴霧してからご使用ください。

● 噴霧距離と噴霧面積の目安

噴霧する距離	噴霧される面積
約10cm離して	手のひら1つ分

このスプレー容器は逆さにしても同様に噴霧できます。



- 吸入する可能性のある顔面や頭部等には、注意して噴霧してください。
- 耳や鼻の中に入らないよう注意してください。また、傷口、皮膚のひび割れやただれているところには噴霧しないでください。
- 目の中や目の周辺には噴霧しないでください。万一、目の中に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師又は薬剤師にご相談ください。
- 使用した後は、噴霧口を拭き取り、付属のキャップをして、なるべく涼しい所に保管してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
- 途中で噴霧できなくなった時（薬液が少なくなって空気が入った時など）は、真っすぐ立てて空噴霧してください。
- 噴霧できなくなる恐れがありますので、針のような物で突くなどして噴霧口に傷をつけないでください。



製造販売元

コーアイセイ株式会社

山形市若葉町13番45号