

炭酸ランタンOD錠

250mg・500mg「イセイ」を

服用される患者様へ

このお薬を正しく服用するため、
飲む前に必ずお読みください。

【服用方法】

食事の直後に飲んでください。お薬は水なしでも服用できるOD錠(口腔内崩壊錠)です。お薬を舌の上で唾液を含ませ、舌で軽くつぶし、飲み込んでください。少量の水またはぬるま湯で飲むこともできます。服用量は患者様によって異なる場合がありますので、主治医の指示に従ってください。



【服用時の注意】

多く飲んでしまった場合は、すぐに担当の医師または薬剤師に相談してください。
主治医の指示なしに自分の判断で飲むのを止めないでください。



【生活上の注意】

リンを多く含む食事の制限など、指示されている食事療法があれば守ってください。腹部X線撮影時には、胃腸管にバリウム様の陰影を認めることができますので、撮影時には医師に相談してください。

【副作用】

吐き気・嘔吐、便秘、腹部不快感、腹痛、下痢、食欲不振、消化不良、発疹、かゆみなどの症状があらわれることがあります。

上記以外でも気になる症状があらわれたときは、担当の医師または薬剤師に速やかに相談してください。

【保管方法】

直射日光、高温、湿気をさけて室温(1~30°C)で保管してください。
乳幼児・小児のお子様の手の届かないところに保管してください。
お薬が残った場合、お薬を受け取った薬局に相談してください。

【薬の名前、剤形】

炭酸ランタンOD錠 250mg「イセイ」 炭酸ランタンOD錠 500mg「イセイ」

実物大



表面



裏面



側面

実物大



表面



裏面



側面



ご不明な点は、担当の医師または薬剤師に相談してください。

製造販売元



コーライセイ株式会社